



## PROBLEMI CUTANEI NELLA LEISHMANIOSI DEL CANE

### COS'È?

La leishmaniosi è una malattia infettiva causata nei paesi del Mediterraneo da un protozoo, *Leishmania infantum*, trasmesso al cane attraverso la puntura dei flebotomi, piccoli insetti che volano soprattutto al tramonto. È una zoonosi comune in Italia, dove in alcune aree è endemica. Causa molti problemi, per lo più gravi, sia cutanei sia degli organi interni e di conseguenza i segni clinici sono molti, spesso diversi fra loro. La diagnosi precoce, la terapia adeguata e un attento e costante monitoraggio del paziente attraverso l'esame fisico generale e gli esami del sangue e delle urine sono fondamentali per ottenere il controllo della malattia. L'infezione normalmente persiste cronica anche se i segni clinici della malattia migliorano con le cure specifiche.

### PROBLEMI CUTANEI

I problemi cutanei sono tra i più comuni nei cani con la leishmaniosi e sono molto variabili. Includono scaglie ("forfora"), alopecia (mancanza di pelo), ulcere che non si chiudono, specie sulle prominenze ossee degli arti, papule localizzate soprattutto nelle aree con meno pelo (naso, orecchie, addome), noduli, ulcere sulle punte dei padiglioni auricolari o al centro dei cuscinetti plantari, problemi alle unghie (crescono troppo, si rompono, sanguinano), ipercheratosi, cioè ispessimento e desquamazione, del naso e dei cuscinetti plantari e raramente pustole e prurito.

### DIAGNOSI

La diagnosi può essere complessa. Quando si sospetta che i problemi cutanei del cane sono dovuti alla leishmaniosi devono essere eseguite indagini per "stadiare" la malattia e talora anche esami specifici per ricercare la *Leishmania* nella pelle.



### NOVITA'

- Sono stati descritti recentemente diversi casi di dermatite pustolosa associata alla leishmaniosi nel cane. Si tratta di una dermatite caratterizzata da prurito e pustole che non migliorano con la terapia antibiotica
- Questa dermatite pustolosa di solito non risponde bene alla sola terapia specifica per la leishmaniosi e i cani hanno bisogno di essere curati anche con farmaci antinfiammatori o immunomodulatori